

<b>Basilico</b>		ZL Nr 008517- 60	
Wirkstoff	100 g/ltr Mesotrione als Suspensionskonzentrat (SC) formuliert		
Wirkstoffgruppe	HRAC Klasse F2		
Wirkungsweise	Carotinbiosynthesehemmer		
Indikation	Körner- und Futtermais (BBCH 12-18) im 2 - 8 Blattstadium		
Anwendung	1 x in der Kultur und je Jahr		
Bienen	nicht Bienengefährlich (B4)		
Gebinde	5 ltr Kanister	4 x 5 ltr Basilico	
		Aufwandmenge	Wartezeit
Schadorganismus	Einjährige zweikeimblättrige Unkäter	0,75 l/ha	F
	Hühnerhirse	1,5 l/ha	
Anwendungs bestimmungen	Abstand zu Oberflächengewässern mit abdriftmindernder Technik (m)	NW 609-1	Ohne abdriftmind. Technik 5m 50%:*, 75%:*, 90%:*
	Abstandsauflagen zu Saumstrukturen**	NT 103	Standard: 20 m mit 90% abdriftmindernder Technik: 0 m
	Saumstreifen bei Hangneigung > 2%	NW 705	5 m
	Auflagen drainierte Flächen	NW 800	gültig vom 1.Nov bis zum 15.März
<small>NW 609-1*= nur länderspezifische Mindestabstand einzuhalten            NT103**= nicht einzuhalten bei Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten, wenn angrenzende Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind, oder die Anwendung in einem Gebiet mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen erfolgt (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13.April 2002) oder wenn angrenzende Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerlich genutzte Flächen angelegt wurden</small>			